

Chiffres clefs sur les papillons de jour en France et en Centre-Val de Loire

L'Observatoire national de la biodiversité a publié en 2022 un indicateur de disparition des papillons de jour dans les départements de métropole. L'Observatoire régional de la biodiversité en Centre-Val de Loire décline les données pour rendre compte de la situation sur le territoire.


Mars 2023

En France

305

espèces de papillons de jour¹


(source Oreina)



Sur 301 papillons de jour² inventoriés entre 1900 et 2000, 66 % ont disparu d'au moins un département depuis 2000³

soit **200** espèces

Nombre d'espèces perdues par département depuis 2000³




En Centre-Val de Loire

147

espèces de papillons de jour¹


(source Liste rouge régionale)



Sur 126 papillons de jour² inventoriés entre 1900 et 2000, 27 % ont disparu d'au moins un département depuis 2000³

soit **38** espèces


Nombre d'espèces perdues par département depuis 2000³



SITUATION RÉGIONALE

Perte probable

Proportion de papillons de jour non revus depuis 20 ans et plus, par département en région



Enjeux spécifiques au territoire

Les causes de disparitions sont principalement la destruction des écosystèmes et l'amoindrissement des ressources florales.

Le plan régional d'action en faveur des papillons de jour a pour objectif de favoriser la conservation des espèces menacées sur le territoire, d'améliorer la connaissance sur les dynamiques de population et de sensibiliser les acteurs à leur préservation.

Deux espèces phares du plan régional d'actions

Le Damier de la succise se rencontre dans les allées forestières humides, les prairies, les marais et tourbières où poussent sa plante-hôte : la succise des prés. Ce papillon est protégé en France et présent dans l'ensemble de la région à l'exception de l'Eure-et-Loir.

L'Azuré du thym est un lycène vivant sur les pelouses et landes sèches riches en thym. Les chenilles ont également besoin des fourmis pour se développer. Ce papillon a pratiquement disparu de la région, sa dernière observation datant de 2009.

¹Papillons de jour = espèces de rhopalocères + zygènes, inventoriées depuis 1850 environ.

²L'indicateur national compare uniquement les espèces de papillons de jour inventoriées entre 1900-2000 et 2000-2020

³Cela ne signifie pas que les disparitions aient débutées après 2000, le déclin datant à dire d'experts des années 1960

Source chiffres France : ONB, mai 2022 | Source chiffres Centre-Val de Loire : données OPIE (Office pour les insectes et leur environnement), extraction Centre-Val de Loire, décembre 2022